

APLICACIONES EN ORL DONDE EL LASER APORTA VENTAJAS FRENTE A LAS TÉCNICAS CONVENCIONALES.

Dr. José Marques dos Santos. O.R.L.. Hospital Sao Teotónio. Viseu-Portugal. Mayo 2002

INTERVENCIÓN CON ANESTESIA LOCAL

CORNETES:

- Reducción de la hipertrofia de los cornetes o de degeneraciones polipoides de los mismos.
- Eliminación de la hipertrofia de las colas por corte o vaporización.

NO SANGRA NI PRECISA TAMPONAMIENTO.

SEPTO NASAL:

- Vaporización de pólipos sangrantes del septo.
- Dolencia de Rendu-Osler-Weber

NO SANGRA NI PRECISA TAMPONAMIENTO.

REDUCCIÓN DE LAS AMIGDALAS:

- Amígdalas crípticas.
- Amigdalitis crónica.

UVULOPALATOPLASTIAS: Reducción del paladar blando (eliminación de la úvula o hacer una nueva), con mejores resultados en el ronquido si se asocia a la reducción del volumen de los cornetes.

HIPERTROFIA DE LA ÚVULA: Seccionamiento o vaporización parcial de la úvula cuando existe un aumento exagerado de ésta.

PAPILOMAS: Extracción de papilomas de la úvula, pilares de las amígdalas.

LENGUA: Eliminación de Leucoplasias y extracción de tumores.

MUCOSA GINGIVAL: Eliminación de neoformaciones de mucosa gingival.

INTERVENCIÓN CON ANESTESIA GENERAL

AMIGDALITIS:

- Amigdalectomía
- Vaporización de las hipertrofias amigdalinas (amigdalectomía parcial)
- Vaporización de las amígdalas linguales

CORNETES: Eliminación de las conchas bolosas

LARINGE:

- Eliminación de los pólipos de las cuerdas vocales
- Aritnoidectomía
- Tumores